

12 mån

10 kg

| | |
|--------------------|--|
| HLR | 100 /min |
| Kompressionsteknik | 2 fingrar / omslutande handgrepp |

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Defibrillering (4 J/kg) | 40 J |
|--------------------------------|-------------|

| | |
|----------------------|--------------|
| Andningsfrekvens | 25-40 /min |
| Puls | 100-150 /min |
| Systoliskt blodtryck | 80-95 mmHg |

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Svalgtub | 4 - 6 cm |
| Mask | ⊙ 01/△ toddler |
| Ventilationsblåsa | liten (150ml) |
| Laryngoskopblad | rakt blad 1-1,5 |
| Endotracheal tub | |
| | Storlek 4,0 |
| | Längd 12 cm |
| LMA | Storlek 2,0 (luft 10ml) |

| | |
|---------------------------|-------|
| Sugkateter storlek | 8 Fr |
| Nasogastrisk sond storlek | 10 Fr |

| | |
|--|---------------------------|
| Adrenalin 0,01mg/ kg | 0,1 mg |
| Adrenalin 1mg/ml1 | 0,1 ml i.m. |
| Adrenalin 0,1mg/ml | 1,0 ml i.v. |
| Adenosin 0,1 mg/kg | 1,0 mg I.V. |
| (kan höjas till max 0,3mg/kg/dos | 3,0 mg I.V.) |
| Atropin hjärtstopp 0,02 mg/kg | 0,2 mg I.V. |
| Amiodaron 5 mg/kg | 50 mg I.V. |
| Betapred anafylaxi / astma | 3,0 mg I.V./P.O |
| meningit 0,2mg/kg | 2,0 mg I.V. |
| Cefotaxim 75mg/kg | 750 mg I.V. |
| Diazepam pr 0,5 mg/kg | 5,0 mg P.R. |
| (Stesolid klysma 5mg/2,5ml →2,5ml p.r.) | |
| Fenobarbital 20 mg/kg | 200 mg I.V. |
| (pat med fenobarbitalbeh 5mg/kg = 50 mg) | |
| Gentamicin 6 mg/kg | 60 mg I.V. |
| Midazolam 0,2-0,3mg/kg | 2,0 – 3,0 mg I.V. |
| Morfin 0,05 mg/kg | 0,5 mg I.V. |
| Naloxon 0,002-0,01 mg/kg | 0,02 - 0,1 mg I.V. |
| Teofyllamin 3 mg/kg | 25 mg P.R. |
| Tribonat 1 mmol/kg | 10 mmol I.V. |
| (=2ml/kg | 20 ml I.V.) |

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Vätskebolus / Ringer | 20 ml/kg → 200 ml |
| Gluk 10% (vid hypoglykemi) | 2 ml/kg → 20 ml |
| (+infusion G10% 5ml/kg/timme | 50 ml/timme) |