

# 6 mån

# 8,0 kg

HLR	100 /min
Kompressionsteknik	2 fingrar /omslutande handgrepp

<b>Defibrillering (4 J/kg)</b>	<b>40 J</b>
--------------------------------	-------------

Andningsfrekvens	30-45 /min
Puls	110-160 /min
Systoliskt blodtryck	70-90 mmHg

<b>Svalgtub</b>	4cm
<b>Mask</b>	⊙ 0/1
<b>Ventilationsblåsa</b>	liten (150ml)
<b>Laryngoskopblad</b>	rakt blad 1-1,5
<b>Endotracheal tub</b>	
	Storlek 3,5
	Längd 11 cm
<b>LMA</b>	Storlek 1,5 (luft7ml)

Sugkateter storlek	8 Fr
Nasogastrisk sond storlek	10 Fr

<b>Adrenalin</b> 0,01mg/ kg	<b>0,08 mg</b>
Adrenalin 1mg/ml	0,08 ml i.m.
Adrenalin 0,1mg/ml	0,8 ml i.v.
<b>Adenosin</b> 0,1 mg/kg	<b>0,8 mg I.V.</b>
(kan höjas till max 0,3mg/kg/dos	2,4 mg I.V.)
<b>Atropin</b> hjärtstopp 0,02 mg/kg	<b>0,15 mg I.V.</b>
<b>Amiodaron</b> 5 mg/kg	<b>40 mg I.V.</b>
<b>Betapred</b> anafylaxi / astma	<b>3,0 mg I.V./P.O</b>
meningit 0,2 mg/kg	<b>1,6 mg I.V.</b>
<b>Cefotaxim</b> 75mg/kg	<b>600 mg I.V.</b>
<b>Diazepam</b> pr 0,5 mg/kg	<b>4,0 mg P.R.</b>
(Stesolid klysma 5mg/2,5ml →2,0ml p.r.)	
<b>Fenobarbital</b> 20 mg/kg	<b>160 mg I.V.</b>
(pat med fenobarbitalbeh 5mg/kg = 40 mg)	
<b>Gentamicin</b> 6 mg/kg	<b>48 mg I.V.</b>
<b>Midazolam</b> 0,2-0,3mg/kg	<b>1,6 – 2,4 mg I.V.</b>
<b>Morfin</b> 0,05 mg/kg	<b>0,4 mg I.V.</b>
<b>Naloxon</b> 0,002-0,01mg/kg	<b>0,02 - 0,08 mg I.V.</b>
<b>Teofyllamin</b> 3 mg/kg	<b>25 mg P.R.</b>
<b>Tribonat</b> 1 mmol/kg	<b>8 mmol I.V.</b>
(=2ml/kg)	16ml I.V.)

<b>Vätskebolus / Ringer</b>	<b>20 ml/kg</b>	<b>→ 160 ml</b>
<b>Gluk 10%</b> (vid hypoglykemi)	<b>2 ml/kg</b>	<b>→ 16 ml</b>
(+infusion G10% 5 ml/kg/timme	<b>40 ml/timme)</b>	